










¿Cuándo aconsejar el manejo en casa?	¿Cuándo aconsejar el manejo en el hospital?
<ul style="list-style-type: none"> El paciente tiene síntomas leves: <ul style="list-style-type: none"> Fiebre de bajo grado (menor de 38°C). Tos. Malestar general. Secreción nasal (moquera). Odinofagia (dolor al tragar). Diarrea. El paciente no tiene comorbilidades como enfermedad pulmonar, cardíaca, renal u hormonal (incluidas la diabetes o la obesidad). El paciente no tiene una condición de inmunosupresión (cáncer, VIH detectable) El paciente se rehúsa a ser hospitalizado o atendido en un centro de triaje aún después de proporcionarle toda la información necesaria. El transporte hacia el hospital es inseguro o inaccesible. 	<ul style="list-style-type: none"> Síntomas moderados o severos: <ul style="list-style-type: none"> Dificultad para respirar. Opresión o dolor torácico. Alteración del estado de conciencia. Incapacidad para despertarse o mantenerse despierto. Coloración morada-azulada de los labios o dedos. Vómitos frecuentes y/o diarrea profusa. Si el paciente presenta alguno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> Saturación de oxígeno inferior a 92% usando un pulsioxímetro Frecuencia respiratoria arriba de 24/min. El paciente tiene comorbilidades. El paciente es inmunodeprimido. El paciente tiene una edad mayor a 60 años. Cuando el paciente refiere que quiere ser atendido en un centro de triaje o en un hospital. 


¿Qué debemos aconsejarles a las personas que presentan síntomas sospechosos de COVID-19?

- 

1 **Quédense en casa, salga sólo si requiere atención médica.**
- 


2 **Solicite a un familiar que esté pendiente de su estado de salud. Permanezca en una habitación alejada de otros miembros de su familia.**
- 


3 **No se auto medique, en caso de presentar fiebre tome acetaminofén. Manténgase hidratado. .**
- 


4 **Vigile los síntomas y signos de alarma. Si presenta signos de alarma, visite el centro de salud u hospital.**
- 

5 **Siga las indicaciones dadas por el personal de salud de la comunidad.**